

BD/2015/REG NL 8652/zaak 458188

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN,

In overeenstemming met de

MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,

Gezien het verzoek van Boehringer Ingelheim B.V. te Alkmaar d.d. 23 maart 2015 tot wijziging van de registratie van het diergeneesmiddel **MAMYZIN**, registratienummer **REG NL 8652**;

Gelet op artikel 2.19 van de Wet dieren;

Gehoord de Commissie Registratie Diergeneesmiddelen;

BESLUIT:

1. De wijziging van het diergeneesmiddel **MAMYZIN**, ingeschreven onder nummer **REG NL 8652**, zoals aangevraagd d.d. 23 maart 2015, is goedgekeurd.
2. De gewijzigde Samenvatting van Productkenmerken behorende bij het diergeneesmiddel **MAMYZIN**, ingeschreven onder nummer **REG NL 8652** treft u aan als bijlage A behorende bij dit besluit.
3. Het gewijzigde etiket en, in voorkomend geval, de gewijzigde bijsluiter behorende bij het diergeneesmiddel **MAMYZIN**, ingeschreven onder nummer **REG NL 8652** treft u aan als bijlage B behorende bij dit besluit.
4. De fabrikant dient binnen zes maanden na het verstrekken van de gewijzigde beschikking, de bestaande voorraad (met ongewijzigde productinformatie) af te leveren.
5. Deze beschikking treedt heden in werking.

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN,

voor deze:

Utrecht, 17 april 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Verheijen', written in a cursive style.

dhr. ir. F. Verheijen
Hoofd Bureau Diergeneesmiddelen

BIJLAGE A
SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

MAMYZIN, poeder voor suspensie voor injectie voor runderen

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Per flacon:

Werkzaam bestanddeel:

Penethamaathydrojodide 5 of 10 g

Hulpstoffen:

Per ml solvens:

Methylparahydroxybenzoaat 1,5 mg

Zie rubriek 6.1 voor de volledige lijst van hulpstoffen.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Poeder voor suspensie voor injectie met bijbehorend solvens.

4. KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Doeldiersoort

Rund

4.2 Indicaties voor gebruik met specificatie van de doeldiersoorten

Acute klinische en subklinische mastitis gedurende de lactatie, veroorzaakt door stafylococce en streptococce.

4.3 Contra-indicaties

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor penicilline

4.4 Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Geen

4.5 Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Niet intraveneus toedienen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

4.6 Bijwerkingen (frequentie en ernst)

In zeer zeldzame gevallen kan anafylactische shock voorkomen.

De frequentie van bijwerkingen is als volgt gedefinieerd:

- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertoont bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling)
- Vaak (1 tot 10 van de 100 dieren)
- Soms (1 tot 10 van de 1.000 dieren)
- Zelden (1 tot 10 van de 10.000 dieren)
- Zeer zelden (1 tot 10 van de 100.000 dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

4.7 Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.

4.8 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen bekend.

4.9 Dosering en wijze van toediening

Uitsluitend intramusculair toedienen, bij voorkeur in de nek.

10.000 – 15.000 I.E. (10-15 mg penethamaathydrojodide) per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 dagen, overeenkomend met 1-1,5 gram per 100 kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3 dagen.

5 g penethamaathydrojodide oplossen per 15 ml steriel water (steeds i.v.m. overdruk lucht terugzuigen).

10 g penethamaathydrojodide oplossen per 30 ml steriel water (steeds i.v.m. overdruk lucht terugzuigen).

4.10 Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen te verwachten dan die genoemd onder rubriek 4.6.

4.11 Wachttermijn

Melk: 4 dagen
(Orgaan)Vlees: 10 dagen

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

Farmacotherapeutische groep: Antibiotica

ATCvet-code: QJ01CE90

5.1 Farmacodynamische eigenschappen

Door de parenterale benadering van mastitis met het middel worden de bacteriële infectiehaarden, ondanks de verstopte melkgangen, goed bereikt. Grondig en frequent uitmelken bevordert de penetratie van het middel in de uier.

5.2 Farmacokinetische eigenschappen

Het middel wordt snel en volledig vanuit de injectieplaats geabsorbeerd. Penethamaathydrojodide is een zwakke base en heeft een hoge vetoplosbaarheid. Benzylpenicilline wordt uitgescheiden via de melk.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

Eidooier lecithine
Isopropylalcohol
Polysorbaat 81
Natriumcitraat watervrij droogmiddel
Methylparahydroxybenzoaat
Steriel water voor injecties

6.2 Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen

6.3 Houdbaarheidstermijn

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking:
Poeder: 3 jaar
Solvens: 3 jaar
Gesuspendeerd product: 2 weken of 2 dagen afhankelijk van de bewaarconditie, zie onder rubriek 6.4.

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Poeder en solvens: bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Gesuspendeerd product: bewaren beneden 25°C. In de koelkast bewaard, wordt de houdbaarheidstermijn verlengd (van 2 dagen naar 2 weken).

6.5 Aard en samenstelling van de primaire verpakking

Poeder: glazen flacon (type I) van 20 of 50 ml gevuld met 5 g of 10 g penethamaathydrojodide, poeder voor suspensie voor injectie, afgesloten met een butylrubber stop en aluminium felscapsule;
Solvens: glazen flacon (type I) van 20 of 50 ml gevuld met 15 ml of 30 ml steriel water voor suspensie voor injectie, afgesloten met een butylrubber stop en aluminium felscapsule.

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte diergeneesmiddel of eventueel uit het gebruik van een dergelijk middel voortvloeiend afvalmateriaal

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

7. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Boehringer Ingelheim Vetmedica
Comeniusstraat 6
1817 MS Alkmaa
Nederland

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

REG NL 8652

9. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING/ VERLENGING VAN DE VERGUNNING

Datum van eerste vergunningverlening: 13 september 1995
Datum van laatste verlenging: 13 september 2005

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

17 april 2015

KANALISATIE

UDD

BIJLAGE B
ETIKETTERING EN BIJSLUITER

I. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Kartonnen doos 10 x 5 g

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Mamyzin, poeder voor suspensie voor injectie voor runderen

2. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per flacon
5 g penethamaathydrojodide
15 ml steriel water

Per ml solvens:
Methylparahydroxybenzoaat 1,5 mg

3. FARMACEUTISCHE VORM

Poeder voor suspensie voor injectie met bijbehorend solvens.

4. VERPAKKINGSGROOTTE

10 flacons à 5 g met 10 flacons à 15 ml steriel water

5. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund

6. INDICATIES

Acute klinische en subklinische mastitis gedurende de lactatie, veroorzaakt door stafylococce en streptococce.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN VAN TOEDIENING

Rund: intramusculair (in de nek): 5 g penethamaat oplossen in 15 ml steriel water (steeds i.v.m. overdruk lucht terugzuigen).

Algemeen: 10.000-15.000 I.E. penicilline (10-15 mg penethamaathydrojodide) per kg lichaamsgewicht/dag, gedurende 3 dagen. Dit is 1-1,5 g per 100 kg lichaamsgewicht.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTERMIJN

melk: 4 dagen
(orgaan) vlees: 10 dagen

9. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Mag niet intraveneus worden toegediend.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Niet te gebruiken na:

11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren beneden 25°C, niet in koelkast bewaren en niet invriezen.

Houdbaarheid na oplossing

In de koelkast 2 weken.

Buiten de koelkast en beneden 25°C, 2 dagen.

**12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, indien van toepassing**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. UDD

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Boehringer Ingelheim BV
Alkmaar

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDLEL BRENGEN

REG NL 8652

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Charge nr.

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

5 g

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Mamyzin, poeder voor suspensie voor injectie voor runderen

2. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN5 g penethamaathydrojodide ($5 \cdot 10^6$ IE penicilline G)
15 ml steriel water**3. FARMACEUTISCHE VORM****4. VERPAKKINGSGROOTTE**

5 g

5. DIERSOORTWAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund

6. INDICATIES

Acute klinische en subklinische mastitis gedurende de lactatie, veroorzaakt door stafylococcen en streptococcen.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN VAN TOEDIENING

Rund: intramusculair (in de nek): 5 g penethamaat oplossen in 15 ml steriel water (steeds i.v.m. overdruk lucht terugzuigen).

Algemeen: 10.000-15.000 I.E. penicilline (10-15 mg penethamaathydrojodide per kg lichaamsgewicht/dag, gedurende 3 dagen. Dit is 1-1,5 g per 100 kg lichaamsgewicht.

8. WACHTTERMIJNmelk: 4 dagen
(orgaan)vlees: 10 dagen**9. SPECIALE WAARSCHUWINGEN**

Mag niet intraveneus worden toegediend.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Niet te gebruiken na:

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren beneden 25°C, niet in koelkast bewaren en niet invriezen.

Houdbaarheid na oplossing

In de koelkast 2 weken.

Buiten de koelkast en beneden 25°C, 2 dagen.

**12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN****13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, indien van toepassing**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik

UDD

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Boehringer Ingelheim bv
Alkmaar

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

REG NL 8652

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Charge nr.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doos 10 x 10 g****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Mamyzin, poeder voor suspensie voor injectie voor runderen

2. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELENPer flacon
10 g penethamaathydrojodide
30 ml steriel waterPer ml solvens:
Methylparahydroxybenzoaat 1,5 mg**3. FARMACEUTISCHE VORM**

Poeder voor suspensie voor injectie met bijbehorend solvens.

4. VERPAKKINGSGROOTTE

10 flacons à 10 g met 10 flacons à 30 ml steriel water

5. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund

6. INDICATIES

Acute klinische en subklinische mastitis gedurende de lactatie, veroorzaakt door stafylococcen en streptococcen.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN VAN TOEDIENING

Rund: intramusculair (in de nek): 10 g penethamaat oplossen in 30 ml steriel water (steeds i.v.m. overdruk lucht terugzuigen).

Algemeen: 10.000-15.000 I.E. penicilline (10-15 mg penethamaathydrojodide) per kg lichaamsgewicht/dag, gedurende 3 dagen. Dit is 1-1,5 g per 100 kg lichaamsgewicht.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTERMIJNmelk: 4 dagen
(orgaan) vlees: 10 dagen

9. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Mag niet intraveneus worden toegediend.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Niet te gebruiken na:

11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren beneden 25°C, niet in koelkast bewaren en niet invriezen.

Houdbaarheid na oplossing

In de koelkast 2 weken.

Buiten de koelkast en beneden 25°C, 2 dagen.

**12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, indien van toepassing**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. UDD

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Boehringer Ingelheim bv
Alkmaar

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

REG NL 8652

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Charge nr.

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**10 g****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Mamyzin, poeder voor suspensie voor injectie voor runderen

2. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN10 g penethamaathydrojodide ($10 \cdot 10^6$ IE penicilline G)
30 ml steriel water**3. FARMACEUTISCHE VORM****4. VERPAKKINGSGROOTTE**

10 g

5. DIERSOORTWAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund

6. INDICATIES

Acute klinische en subklinische mastitis gedurende de lactatie, veroorzaakt door stafylococcen en streptococcen.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN VAN TOEDIENING

Rund: intramusculair (in de nek): 10 g penethamaat oplossen in 30 ml steriel water (steeds i.v.m. overdruk lucht terugzuigen).

Algemeen: 10.000-15.000 I.E. penicilline (10-15 mg penethamaathydrojodide per kg lichaamsgewicht/dag, gedurende 3 dagen. Dit is 1-1,5 g per 100 kg lichaamsgewicht.

8. WACHTTERMIJNmelk: 4 dagen
(orgaan)vlees 10 dagen**9. SPECIALE WAARSCHUWINGEN**

Mag niet intraveneus worden toegediend.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Niet te gebruiken na:

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren beneden 25°C, niet in koelkast bewaren en niet invriezen.

Houdbaarheid na oplossing

In de koelkast 2 weken.

Buiten de koelkast en beneden 25°C, 2 dagen.

**12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN****13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, indien van toepassing**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

UDD

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Boehringer Ingelheim bv
Alkmaar

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

REG NL 8652

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Charge nr.

II. BIJSLUITER

BIJSLUITER

Mamyzin, poeder voor suspensie voor injectie voor runderen

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Boehringer Ingelheim bv
Comeniusstraat 6
1817 MS Alkmaar
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Lohmann Pharma Herstellung GmbH
Heinz-Lohmann-Straße 5
27472 Cuxhaven
Duitsland

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Mamyzin, poeder voor suspensie voor injectie voor runderen

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Samenstelling

Penethamaathydrojodide (suspenderbaar poeder) 5 g
Steriel water 15 ml

Of:

Penthamaathydrojodide (suspenderbaar poeder) 10 g
Steriel water 30 ml

Per ml solvens:

Methylparahydroxybenzoaat 1,5 mg

4. INDICATIES

Acute klinische en subklinische mastitis gedurende de lactatie, veroorzaakt door stafylococcen en streptococcen.

5. CONTRA-INDICATIES

Niet toedienen aan dieren, waarvan bekend is dat ze overgevoelig zijn voor penicilline.

6. BIJWERKINGEN

In zeer zeldzame gevallen kan anafylactische shock voorkomen.

De frequentie van bijwerkingen is als volgt gedefinieerd:

- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertoont bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling)
- Vaak (1 tot 10 van de 100 dieren)
- Soms (1 tot 10 van de 1.000 dieren)
- Zelden (1 tot 10 van de 10.000 dieren)
- Zeer zelden (1 tot 10 van de 100.000 dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN VAN TOEDIENING

Uitsluitend intramusculair toedienen, bij voorkeur in de nek.

10.000 – 15.000 I.E. (10-15 mg penethamaathydrojodide) per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 dagen, overeenkomend met 1-1,5 g per 100 kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3 dagen.

5 g penethamaathydrojodide oplossen per 15ml steriel water (steeds i.v.m. overdruk lucht terugzuigen).

10 g penethamaathydrojodide oplossen per 30ml steriel water (steeds i.v.m. overdruk lucht terugzuigen).

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Geen.

10. WACHTTERMIJN

Melk: 4 dagen.

(orgaan)vlees: 10 dagen.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 3 jaar.

Voor uiterste gebruiksdatum: Zie verpakking.

Bewaren beneden 25°C, niet in koelkast bewaren en niet invriezen.

Houdbaarheid gesuspendeerd

In de koelkast 2 weken.

Buiten de koelkast en beneden 25°C, 2 dagen.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Niet intraveneus toedienen.

In verband met mogelijke sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

17 april 2015

15. OVERIGE INFORMATIE

Mamyzin wordt snel en volledig vanuit de injectieplaats geabsorbeerd. Penethamaathydrojodide is een zwakke base en heeft een hoge vetoplosbaarheid. Dit maakt het preparaat uitermate geschikt voor de behandeling van mastitis en respiratoire aandoeningen.

Door de parenterale benadering van mastitis met Mamyzin worden de bacteriële infectiehaarden, ondanks de verstopte melkgangen, goed bereikt. Grondig en frequent uitmelken bevordert de penetratie van Mamyzin in de uier.

Verpakking

Doos met 10 flacons à 5 g penethamaathydrojodide: 10 flacons à 15 ml steriel water.

Doos met 10 flacons à 10 g penethamaathydrojodide: 10 flacons à 30 ml steriel water.

REG NL 8652

UDD